

Levantamiento mamario post cirugía bariática

Dr. Luis González

Centro de Cirugía Plástica EGS, C/ Socorro Sánchez No. 56, 2do piso, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel: (809) 686-2417. Correo Electrónico: legv63@hotmail.com

Los casos de flacidez y caída de los senos post cirugía bariática son mas graves que los que se presentan en la población normal y que no hayan perdido tanto peso.

¿En cuáles pacientes está indicada?

En los pacientes sanos y emocionalmente estables con expectativas reales ven la necesidad de mejorar su imagen corporal y autoestima ya que al perder mucho peso y consumirse la grasa del seno, se produce una gran flacidez que modifica totalmente la forma y la anatomía mamaria.

Planificando la cirugía...

Recordemos que los senos se componen de una menor parte de tejido glandular y otra mayor que es el tejido graso que están unidos y envueltos por una cobertura cutánea.

Es necesario que exista una buena comunicación entre el paciente y su medico, exponiendo claramente sus expectativas, para que así el cirujano plástico pueda orientarle sobre los posibles buenos logros y las limitantes del procedimiento en su caso particular.

¿Cuál es el procedimiento?

Muchas veces se logra realizar un levantamiento solo con sus propios tejidos, pero la gran mayoría requiere del uso de una técnica combinada de colocación de prótesis mamarias y levantamiento de los tejidos caídos (ver levantamiento y aumento mamario).

En el hombre se presenta un aspecto femenino de los pechos, lo que se conoce como ginecomastia. En estos casos generalmente se realizan procedimientos quirúrgicos que dejan cicatrices para poder eliminar el gran exceso de piel (ver ginecomastia).

